

SUIVI SANITAIRE DES ÉTALONS

Étalons en IA toutes races ⁽¹⁾			X	X	X	X	X
Race de production	Certificat aptitude MN	Dourine	AIE	MCE Début monte	AVE	Grippe	Rhino pneumonie
PS, AQPS	X	X	X	X	Complet	X	X
Trotteur Français, Selle Français,			X	X	Complet	X	X
Anglo-Arabe, Demi-sang AA, Arabe ⁽²⁾ , Demi-sang Arabe ⁽²⁾ , Poney Français de Selle, New-Forest ⁽³⁾ , Welsh, Connemara, Cheval Corse, CSAN			X	X	Allégée	X	X
Mérens ⁽⁴⁾ , Shagya, Vercors			X	X		X	X
Trakehner					Complet		
Islandais, Crème, Lusitanien, Henson, Lipizzan					Allégée		

⁽¹⁾ **Étalons utilisés en insémination artificielle** : les tests sont sous la responsabilité du chef de centre de collecte et peuvent être contrôlés par les DDecPP.

En cas d'étalon fonctionnant uniquement en insémination artificielle congelée, l'éta lonnier engage sa responsabilité à commercialiser et mettre en place uniquement des doses conformes à la réglementation sanitaire en vigueur au moment de leur production et à ne pas utiliser l'étalon dans un autre type de monte.

⁽²⁾ Les étalons de race Arabe et Demi-sang Arabe doivent également faire l'objet d'un dépistage SCID et CA.

⁽³⁾ Les étalons New-Forest doivent également faire l'objet d'un dépistage pour la Myotonie

⁽⁴⁾ Les étalons Mérens doivent utiliser un test PSSM1 et le test gène de coloration

Haflinger : contactez l'association de race pour connaître le suivi sanitaire à effectuer. Les étalons **Haflingers** doivent utiliser le test PSSM1.

PIÈCES À FOURNIR SELON LA MALADIE CONCERNÉE – Utilisez le formulaire unique de demande d'analyse

L'utilisation du formulaire unique pré-identifié autorise le laboratoire à transmettre les résultats des analyses de votre étalon directement au SIRE et vous dispense de l'envoi des pièces (sous réserve de qualification du laboratoire).

Maladie	Pièces à fournir	Fréquence / date
Dourine	Sérologie négative par fixation de complément datant de moins de 3 mois ou Attestation complémentaire dourine	Si étalon a séjourné depuis moins de 12 mois dans un pays non indemne de dourine : autres cas
Anémie Infectieuse des Équidés (AIE)	Test de Coggins négatif ou ELISA*	1ere monte : datant de moins de 3 mois et renouvelé tous les 3 ans
Mérite Contagieuse Équine (MCE)	Test avant monte : Ecouvillon sur la fosse urétrale Culture bactériologique ou Immunofluorescence négatif ou PCR <i>Pour Tous : Recherche de Taylorella Eq.</i> <i>Pour PS et AQPS: Recherche de Klebsiella et Pseudomonas</i>	à partir du 1 ^{er} décembre année précédente
Artérite Virale Équine (AVE) complet	Sérologie négative Ou contrôle virologique sur sperme négatif (1 seul sperme analysé en PCR est suffisant) ou vaccination contre AVE Pour PS et AQPS : ELISA accepté	Sérologie et/ou virologie à partir du 1 ^{er} décembre année précédente Vaccination : après sérologie négative de moins de 30 jours primo vaccination en 2 injections entre 3 et 6 semaines et rappel tous les 6 mois sans dépasser 8 mois
AVE Allégée	Dans le cas d'étalons séropositifs non excréteurs après contrôle virologique sur sperme négatif Le contrôle virologique n'est pas obligatoire tous les ans tant que le test sérologique réalisé chaque année montre un taux d'anticorps stable ou déclinant (pas plus d'une dilution d'augmentation par rapport au test sérologique initial)	à partir du 1 ^{er} décembre année précédente
Grippe	Copie de la page vaccination Avec nom du cheval	Protocole AMM Primo vaccination par 2 injections entre 3 et 6 semaines et 1 ^{er} rappel à 6 mois puis rappel annuel Vaccinations valides à la demande de carnet de saillie
Rhinopneumonie	Copie de la page vaccination Avec nom du cheval	

* Le dépistage de l'anémie infectieuse est possible par ELISA pour les étalons PS-AQPS prélevés dans un autre Etat Membre Européen.

SUIVI SANITAIRE DES JUMENTS

PS – AQPS et pour les « label sanitaire course » Arabe et Anglo-Arabe : Le suivi sanitaire concerne toutes les juments **quel que soit leur race** appartenant au harem des étalons qui produisent au moins 1 poulain à inscrire dans la race : **Avant Premier Saut => test MCE** (+ jument PS et AQPS : Klebsiella pn. et Pseudomonas aer.) sur sinus et/ou fosse clitoridiens, **sérologie AVE négative** ou 2 tests positifs stables espacés de 14 jours à 2 ans, **vaccination grippe et rhinopneumonie** selon le protocole AMM ci-dessus.

Trotteur Français : les vaccinations **grippe et rhinopneumonie** sont obligatoires. La preuve doit être conservée pendant 3 ans par l'éta lonnier.

Selle Français – Anglo-Arabe : la vaccination **grippe** est obligatoire